西湖大學
WESTLAKE UNIVERSITY

温室气体甲烷

全球及中国排放分布和趋势

张羽中

zhangyuzhong@westlake.edu.cn

提纲

1. 温室气体甲烷
2. 全球大气甲烷收支
3. 中国甲烷排放：分布和趋势
4. 观测系统模拟实验(OSSE)

温室气体甲烷

Greenhouse gases in last 300 years

Ice core record

MacFarling Meure et al., GRL, 2006

Radiative forcing since industrialization

全球升温潜势
Global Warming
Potential

单位质量甲烷吸
收红外能量的能
力是二氧化碳的
30倍 (100年尺度)

IPCC AR6 2021

大气甲烷的源

大气甲烷的汇

源

$550 \pm 60 \text{ Tg a}^{-1}$

汇
大气寿命约10年

Tropospheric OH
89%

Soil Absorption

Stratospheric Loss

Tropospheric Cl

影响OH浓度的因素

温室气体减排

应对气候变化

中国的承诺

二氧化碳排放力争于**2030年前达到峰值**

努力争取**2060年前实现碳中和**

“十四五”时期 环境领域主要目标

● 推动绿色发展，促进人与自然和谐共生

坚持绿水青山就是金山银山理念

持续改善环境质量，基本消除重污染天气和城市黑臭水体

落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标

加快发展方式绿色转型

首次提出
控制甲烷
等非二氧化碳
温室气体

《2021两会政府工作报告》

甲烷排放的监测：从全球到点源

全球/国家

考察全球浓度变化的驱动因素
考察自然源和汇的反馈

(a) 2010–2018 emission trends ($\% a^{-1}$)

全球2010–2018年甲烷收支

GOSAT 卫星

区域

支持区域政策制定
理解控制区域排放源的因素

重点油气生产区域高分辨率反演

TROPOMI 卫星

点源/设施

发现异常排放点源
采取维修、监管措施

~10 m 分辨率

油气生产设施super emitter

高分五号

不同时空尺度之间信息的整合

卫星观测数据的分析：从浓度到排放

Emission monitoring vs concentration monitoring

区域浓度观测与排放之间复杂的关系

2010年3月

杭州
本地
排放

全球
背景

2010年9月

甲烷卫星观测

Solar backscatter

Absorption along
the light path

卫星遥感观测反演的技术路线

$$J(x) = (x - \underline{x}_a)^T \mathbf{S}_a^{-1} (x - \underline{x}_a) + \gamma (\underline{y} - \mathbf{K}x)^T \mathbf{S}_0^{-1} (\underline{y} - \mathbf{K}x)$$

先验信息

先验信息的不确定度

卫星观测

观测和模型的不确定度

正向模型：观测对排放的敏感度

发展迅速的卫星观测能力

Low precision
high spatial resolution

High precision
low spatial resolution

甲烷排放的监测：从全球到点源

全球/国家

考察全球浓度变化的驱动因素
考察自然源和汇的反馈

(a) 2010–2018 emission trends ($\% a^{-1}$)

全球2010–2018年甲烷收支

GOSAT 卫星

区域

支持区域政策制定
理解控制区域排放源的因素

重点油气生产区域高分辨率反演

TROPOMI 卫星

点源/设施

发现异常排放点源
采取维修、监管措施

~10 m 分辨率

油气生产设施super emitter

高分五号

不同时空尺度之间信息的整合

提纲

1. 温室气体甲烷
2. 全球大气甲烷收支
3. 中国甲烷排放：分布和趋势
4. 观测系统模拟实验(OSSE)

全球大气甲烷浓度变化

CH₄ concentration in last 35 years

Surface measurement network

卫星数据的反演分析

1 Best available prior information

2 Improved stratospheric bias correction

3 Better treatment for wetland emissions

4 Annual hemispheric OH

全球2010–2018 GOSAT反演：人为源排放

(a) Posterior/prior emission ratios

验证国家清单

U.S.'s Permian Basin (Zhang et al., Science Advances, 2020)

美国最大的油气生产盆地

TROPOMI
甲烷柱浓度

甲烷排放
通量分布

全球2010–2018 GOSAT反演：人为源排放趋势

(a) 2010–2018 emission trends ($\% a^{-1}$)

发展中地区的农业畜牧源增长缺少重视和深入研究

Top 5 countries with fastest growing cattle population

UNFAO

Country	Trend (million head per year)
Pakistan	1.4
Ethiopia	1.2
Tanzania	1.1
Brazil	0.9
Argentina	0.7

卫星和地面甲烷观测互相补充

地面和飞机观测

卫星提供的信息对表征
南半球排放尤为重要

Lu et al, ACP, 2021

湿地排放

湿地排放：评估湿地甲烷生物地球模型

热带湿地排放受降水控制

寒带湿地排放受温度控制

提纲

1. 温室气体甲烷
2. 全球大气甲烷收支
3. 中国甲烷排放：分布和趋势
4. 观测系统模拟实验(OSSE)

中国甲烷排放

人为源排放(百万吨/年)

Zhang et al. (2021)

GWP=30

近年来中国甲烷排放趋势

Satellite inversion

Miller et al., 2019

Coarse resolution
Inaccurate prior sectoral distribution

Bottom-up inventory

Liu et al., 2021

Provincial-level activity data

Changes may not be accounted for
in the bottom-up inventories

部门排放清单的不确定性

Affect inference of methane fluxes as well as sector attribution

Distribution of coal mine emissions from different bottom-up inventories

Sheng et al. (2019)

Sheng et al. (2021) derived a trend (0.4 Tg a^{-2}) smaller than Miller et al. (2019) (1.1 Tg a^{-2})

中国甲烷排放反演

高分辨率区域反演

地面长期观测站点网络

GOSAT卫星观测

地面站点2010-2017

Zhang et al. in prep

中国甲烷排放反演

Bottom-up estimates

Multiple anthropogenic emission inventories are used as prior for (sensitivity) inversions to explore uncertainties

Name	Anthropogenic emissions	Emissions (Tg a ⁻¹)	Trend (Tg a ⁻²)
E1	EDGAR v4.3.2 for 2012, except for coal (Sheng et al., 2019)	59	0
E2	PKU 2010-2017	49	-0.3
E3	EDGAR v5.0 2010-2015	60	+0.4
E4	CEDS v2021-04-21	51	+0.2

Natural emissions are not perturbed in the ensemble

Natural Emissions	Wetland	WETCHARTs
	Biomass burning	GFED4
	Geological seeps	Maasackers et al.
	Termites	Fung et al.

a Urban natural gas supply & consumption from China Energy Year Book

b Rice spatial distribution from G. Zhang et al. (2020), area for early, middle, and late rice from China Agriculture Year Book, emission factors from Yan et al. (2003)

c Area information from China Fishery Year Book; Emission factors from Yuan et al. (2019)

长三角地区甲烷排放源分布

提纲

1. 温室气体甲烷
2. 全球大气甲烷收支
3. 中国甲烷排放：分布和趋势
4. 观测系统模拟实验(OSSE)

排放反演技术路线

观测系统模拟实验 (observation system simulation experiment)

评估不同卫星设计约束排放反演的能力

Sheng et al., AMT, 2018

评估卫星+地面站点观测探测油田甲烷异常泄漏的能力

Cusworth et al., ACP, 2018

城市CO2排放监测网络设计

Turner et al., ACP, 2016

城市CO2排放监测网络设计

站点密度 vs. 观测/模型误差对反演结果的影响

观测系统模拟实验 (observation system simulation experiment)

观测系统模拟实验 (observation system simulation experiment)

总结

- 甲烷是强势的温室气体，控制甲烷排放是减缓全球变暖的必要措施
- 卫星提供了监测甲烷浓度分布的能力；通过反演分析卫星浓度观测，可得到甲烷排放分布和变化的信息
- 全球来看，畜牧甲烷排放呈显著上升趋势；中国近年来甲烷排放仍有上升趋势——不同区域煤矿排放呈不同趋势，水稻排放增长趋势较明显
- 结合多平台观测数据监测甲烷全球及区域排放是辅助甲烷减排的有力工具